



FACILITIES EQUIPPED WITH

Dual Head SPECT Gamma Camera

64 Slices PET/CT

ABT Cyclotron (TRASIS Module)

Nuclear Cardiology Lab

Theranostics' Room

NUCLEAR MEDICINE & THERANOSTICS

Comprehensive Cancer Centre
Dow University of Health & Sciences

Ojha Campus; KDA Scheme 33,
Suparco Road
Gulzar-e-Hijri, Karachi



SCAN TO VISIT

CONTACT US



03422019262



021-111-113-847
(Ext. 3953/3957)



021-111-362-273



nmt@duhs.edu.pk



www.duhs.edu.pk



COMPREHENSIVE CANCER CENTRE
کمپریہینسو کینسر سینٹر

I - 131 WHOLE BODY MIBG SCAN

Name: _____

MR: _____

Age: _____

Gender: _____

Contact No. _____

Referred by: _____

Appointment D/T _____

Instructions

ہدایات

ہدایتون

No need to fast before the test.

ٹیسٹ سے قبل بھوکا رہنے کی ضرورت نہیں۔

ٹیسٹ کان اڳ خالي بيت رهڻ جي ضرورت ناهي.

Any medications that might interfere with MIBG will be adjusted. Consult your Nuclear Physician prior to the appointment.

کوئی بھی ادویات جو MIBG کے ساتھ مداخلت کر سکتی ہیں، ان میں تبدیلی کی جائے گی۔ اپنا نمٹنٹ سے پہلے اپنے نیوکلیئر فزیشن سے مشورہ کریں۔

ڪا به دوا جيڪا MIBG سان مداخلت ڪري سگهي ٿي، ان ۾ تبديلي ڪئي ويندي. ملاقات کان اڳ پنهنجي نيوکليئر فزیشن سان مشورو ڪريو.

Start 1% Lugol's solution at adult dose of 0.8 ml in orange juice at bed time (0.2-0.3 ml in child) daily, start 24 hours prior test and continue 5 days.

۱% لوگول سلوشن کو بالغوں کے لیے 0.8 ملی لیٹر کی خوراک میں اور نچ جو س کے ساتھ رات کو سونے سے پہلے شروع کریں (بچوں کے لیے 0.2-0.3 ملی لیٹر)۔ اسے ٹیسٹ سے ۲۴ گھنٹے پہلے شروع کریں اور ۵ دن تک جاری رکھیں۔

۱% لوگول حل بالغن لاءِ 0.8 ملي ليٽر جي مقدار ۾ نارنگي جوس سان رات جو سمهڻ کان اڳ شروع ڪريو (ٻارن لاءِ 0.2-0.3 ملي ليٽر). ان کي ٽيسٽ کان ۲۴ ڪلاڪ اڳ شروع ڪريو ۽ ۵ ڏينهن تائين جاري رکو.

You will receive a slow intravenous infusion of I-131 MIBG under monitoring of blood pressure and pulse. Imaging under a gamma camera will be performed 48-72 hours after the infusion.

بض کی نگرانی اور خون کے دباؤ کے تحت آپ کو I-131 MIBG آہستہ آہستہ انٹرا وینس انفیوژن دیا جائے گا۔ انفیوژن کے ۴۲-۴۸ گھنٹے بعد گاما کیمرے کے نیچے امیجنگ کی جائے گی۔

بض جي نگراني ۽ رت جي دٻاءَ جي هيٺان توهان کي I-131 MIBG جو آهستي آهستي انٽراوینس انفیوژن ڏنو ويندو. انفیوژن جي ۴۸-۷۲ ڪلاڪ بعد گاما ڪيمرا جي هيٺ تصويرون ورتيون وينديون.

The entire procedure will take about 3 days.

مکمل پروسیجر میں تقریباً ۳ دن لگیں گے۔

مکمل پروسیجر ۾ تقریباً ۳ ڏينهن لڳندا.

Bring previous medical records and the advice slip.

سابقہ میڈیکل ریکارڈز اور مشورے کی پرچی لے کر آئیں۔

اڳوڻا ميڊيڪل ریکارڊ ۽ مشوري جي پرچي گڏ آڻيو.

Avoid bringing small children or pregnant women.

چھوٽے بچوں یا حاملہ خواتین کو لانے سے گریز کریں۔

ندين ٻارن يا حمل واري عورتن کي گڏ آڻڻ کان پاسو ڪريو.

Pregnancy must be excluded in females as the test is contraindicated in pregnancy. Nursing mothers must stop breastfeeding few weeks prior to the test.

حاملہ یا حاملہ خواتین کے لیے یہ ٹیسٹ مناسب نہیں۔ دودھ پلانے والی مائیں، ٹیسٹ ہونے سے کچھ ہفتے پہلے سے کیر پلانا بند کر دیں۔

حمل سان عورتن لاءِ هي ٽيسٽ مناسب ناهي. ڪير پلائيندڙ مائرون ٽيسٽ ٿيڻ کان ڪجهه هفتا اڳ ڪير پلائڻ بند ڪن.

Your test report will be available on the e-portal within 24 hours of completion of test. (Except Sunday and Public Holiday)

آپ کی ٹیسٹ رپورٹ ٹیسٹ مکمل ہونے کے ۲۴ گھنٹوں کے اندر ای۔پورٹل پر دستیاب ہوگی۔ (اتوار اور اعلانیہ تعطیلات کے علاوہ)

توهان جي ٽيسٽ رپورٽ ٽيسٽ مڪمل ٿيڻ کان ۲۴ ڪلاڪن اندر اي۔پورٽل تي دستياب هوندي. (آچر ۽ اعلان ٿيل موڪلن کان سواءِ)