



FACILITIES EQUIPPED WITH

Dual Head SPECT Gamma Camera

64 Slices PET/CT

ABT Cyclotron (TRAVIS Module)

Nuclear Cardiology Lab

Theranostics' Room

NUCLEAR MEDICINE & THERANOSTICS

Comprehensive Cancer Centre
Dow University of Health & Sciences

Ojha Campus; KDA Scheme 33,
Suparco Road
Gulzar-e-Hijri, Karachi



SCAN TO VISIT

CONTACT US



03422019262



021-111-113-847
(Ext. 3953/3957)



021-111-362-273



nmt@duhs.edu.pk



www.duhs.edu.pk



COMPREHENSIVE CANCER CENTRE
کمپریہینسو کینسر سینٹر

I - 131 THERAPY

(IN PATIENT)

Name: _____

MR: _____

Age: _____

Gender: _____

Contact No. _____

Referred by: _____

Appointment D/T _____

Instructions

Fast for 2-4 hours before the test.

Follow a low iodine diet for two weeks prior to the test (Avoid iodine rich food like milk, dairy items, all types of meat, iodized salts and etc).

If you are on thyroxin/Eltroxine, discontinue it for 21 days prior to the test.

A minimum gap of 4-6 weeks is required after exposure to iodine contrast.

You will receive comprehensive counseling about radionuclide therapy prior to admission, including both oral and written instructions. You will be admitted for 1-3 days in a therapy room and will receive an oral dose of I-131. You will be discharged after 1-3 days based on your radiation monitoring record. Imaging may be required 3-5 days after receiving the dose.

You will receive counseling to minimize radiation exposure to your caregiver at home.

The entire procedure can take about 2-3 days.

Bring previous medical records and the advice slip.

Visits will be restricted during admission, and surveillance will be via CCTV with two-way communication..

Pregnancy must be excluded in females as the test is contraindicated in pregnancy. Nursing mothers must stop breastfeeding few weeks prior to the test.

Your test report will be available on the e-portal within 24 hours of completion of test. (Except Sunday and Public Holiday)

ہدایات

ٹیسٹ سے ۲-۴ گھنٹے قبل بھوکا رہنا ضروری ہے۔

ٹیسٹ سے ۲ ہفتے پہلے کم آئیوڈین والی غذا اختیار کریں (آئیوڈین سے بھرپور غذائیں جیسے دودھ، دودھ کی مصنوعات، تمام اقسام کا گوشت، آیوڈائزڈ نمک وغیرہ سے پرہیز کریں)۔

اگر آپ تھائروکسین / ایلٹروکسین پر ہیں، تو ٹیسٹ سے ۲۱ دن پہلے اس کا استعمال بند کر دیں۔

آئیوڈین کنٹراسٹ کے استعمال کے بعد کم از کم 4 سے 6 ہفتوں کا وقفہ ضروری ہے۔

آپ کو داخلے سے پہلے ریڈیونوکلائیڈ تھراپی کے بارے میں مکمل رہنمائی دی جائے گی، جس میں زبانی اور تحریری ہدایات شامل ہوں گی۔ آپ کو 1 سے 3 دن کے لیے تھراپی روم میں داخل کیا جائے گا اور آپ کو I-131 کی خوراک منہ کے ذریعے دی جائے گی۔ آپ کو 1 سے 3 دن بعد آپ کے ریڈی ایشن مانیٹرنگ ریکارڈ کی بنیاد پر ڈسچارج کیا جائے گا۔ خوراک لینے کے 3 سے 5 دن بعد امیجنگ کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔

آپ کے تیماردار کو گھر میں تابکاری سے بچنے کے لیے مشورہ دیا جائے گا۔

پورا طریقہ کار تقریباً 2 سے 3 دن لے سکتا ہے۔

سابقہ میڈیکل ریکارڈ اور مشورے کی پرچی لے کر آئیں۔

داخلے کے دوران ملاقاتیں محدود ہوں گی، اور نگرانی CCTV کے ذریعے دو طرفہ مواصلات کے ساتھ کی جائے گی۔

حاملہ یا حاملہ خواتین کے لیے یہ ٹیسٹ مناسب نہیں۔ دودھ پلانے والی مائیں، ٹیسٹ ہونے سے کچھ ہفتے پہلے سے کیر پلانا بند کر دیں۔

آپ کی ٹیسٹ رپورٹ ٹیسٹ مکمل ہونے کے ۲۴ گھنٹوں کے اندر ای۔ پورٹل پر دستیاب ہوگی۔ (اتوار اور اعلیٰ تعطیلات کے علاوہ)

ہدایتون

ٹیسٹ کان ۲-۴ کلاک اگ خالی بیت رہن ضروری آھی۔

ٹیسٹ کان ۲ ہفتا اگ گھت آیوڈین واری غذا اختیار کریو (آیوڈین سان ڀرپور کانن جھڑوک دودھ، کیرجی شین، هر قسم جو گوشت، آیوڈائزڈ لون وغیرہ کان پرہیز کریو)۔

جیکڈھن توهان ٹائبروکسین / ایلٹروکسین وئی رهیا آھیو، ته ٹیسٹ کان ۲۱ ڏينهن اڳ ان جو استعمال بند کریو۔

آئیوڈین کنٹراسٹ جي استعمال کان پوءِ گھت ۾ گھت 4 کان 6 هفتن جو وقفو ضروري آھی۔

توهان کي داخل ٿيڻ کان اڳ ريڊيونوکلائیڊ ٿراپي بابت مڪمل صلاح ۽ هدايتون ڏنيون وينديون، جن ۾ زباني ۽ لکت واريون هدايتون شامل هونديون۔ توهان کي 1 کان 3 ڏينهن لاءِ ٿراپي روم ۾ داخل ڪيو ويندو ۽ توهان کي I-131 جي خوراڪ وات ذريعي ڏني ويندي۔ توهان کي 1 کان 3 ڏينهن بعد توهان جي ريڊيئيشن مانيٽرنگ رڪارڊ جي بنياد تي ڊسچارج ڪيو ويندو۔ خوراڪ وٺڻ کان 3 کان 5 ڏينهن بعد امیجنگ جي ضرورت پئجي سگهي ٿي۔

توهان جي نگران لاءِ گهر ۾ تابڪاري کان بچڻ لاءِ صلاح ڏني ويندي۔

سڄو طريقو ڪار لڳ ڀڳ 2 کان 3 ڏينهن وٺي سگهي ٿو۔

اڳوڻا ميڊيڪل رڪارڊ ۽ مشوري جي پرچي گڏ آڻيو۔

داخل ٿيڻ دوران ملاقاتون محدود هونديون، ۽ نگراني CCTV جي ذريعي بطرفي رابطي سان ڪئي ويندي۔

حمل سان عورتن لاءِ هي ٽيسٽ مناسب ناهي۔ کير پلائيندڙ مائرون ٽيسٽ ٿيڻ کان ڪجهه هفتا اڳ کير پلائڻ بند ڪن۔

توهان جي ٽيسٽ رپورٽ ٽيسٽ مڪمل ٿيڻ کان ۲۴ کلاڪن اندر اي۔ پورٽل تي دستياب هوندي۔ (آچر ۽ اعلان ٿيل موڪلن کان سواءِ)