



FACILITIES EQUIPPED WITH

Dual Head SPECT Gamma Camera

64 Slices PET/CT

ABT Cyclotron (TRAVIS Module)

Nuclear Cardiology Lab

Theranostics' Room

NUCLEAR MEDICINE & THERANOSTICS

Comprehensive Cancer Centre
Dow University of Health & Sciences

Ojha Campus; KDA Scheme 33,
Suparco Road
Gulzar-e-Hijri, Karachi



SCAN TO VISIT

CONTACT US



03422019262



021-111-113-847
(Ext. 3953/3957)



021-111-362-273



nmt@duhs.edu.pk



www.duhs.edu.pk



COMPREHENSIVE CANCER CENTRE
کمپریہینسو کینسر سینٹر

MYOCARDIAL PERFUSION IMAGING (MPI) (SPECT) WITH STRESS

Name: _____

MR: _____

Age: _____

Gender: _____

Contact No. _____

Referred by: _____

Appointment D/T _____

Instructions for MPI Scan

Fast for 2-4 hours before the test. Have a light breakfast of a bread slice with milk or water on the day of the test, but avoid tea or coffee. Bring a light breakfast with you (preferably an egg sandwich and milk).

Stop β -blockers and calcium blockers 24 hours before the test (consult with your primary physician). Stop nitrates 12 hours before the test. If you are taking oral medication or insulin injection you must skip them on the day of the test (bring your diabetic medicines with you). Stop consuming tea, coffee, chocolate, and other caffeine derivatives 12 hours before the test.

Male patients should shave their chest hair before the test.

Depending on your test advice, you will receive a radiotracer injection during either a treadmill exercise or pharmacological stress. After the stress phase, you will be asked to have a light breakfast. Imaging under a gamma camera will follow. Based on the results of the first imaging, you might need another injection followed by additional imaging after 2-3 hours. May be you will be asked for the second imaging again on the next day.

The entire procedure will take about 3-5 hours.

Bring previous medical records and the advice slip.

Avoid bringing small children or pregnant women.

Inform the staff if you are pregnant, suspect you might be, or are nursing.

Your test report will be available on the e-portal within 24 hours of completion of test.
(Except Sunday and Public Holiday)

ایم پی آئی کے اسکین کے لیے ہدایات

ٹیسٹ سے ۲-۴ گھنٹے قبل بھوکا رہنا ضروری ہے۔ ٹیسٹ کے دن ایک روٹی کے ساتھ دودھ یا پانی کا ہلکا ناشتہ کریں، لیکن چائے یا کافی سے پرہیز کریں۔ ہلکا ناشتہ اپنے ساتھ لائیں (ترجیحاً ایک انڈے کا سینڈوچ اور

دودھ)۔

ٹیسٹ سے ۲۴ گھنٹے پہلے بیٹا بلا کرز اور کیلشیم بلا کرز بند کر دیں (اپنے بنیادی معالج سے مشورہ کریں)۔ ٹیسٹ سے ۱۲ گھنٹے پہلے نائٹریٹس کا استعمال بند کر دیں۔ اگر آپ دوائیں یا انسولین کا انجیکشن لے رہے ہیں تو ٹیسٹ کے دن انہیں نہ لیں (اپنی شوگر کی دوائیں ساتھ لائیں)۔ ٹیسٹ سے ۱۲ گھنٹے پہلے چائے، کافی، چاکلیٹ، اور دیگر کیفین والی چیزوں کا استعمال بند کر دیں۔

مرد مریضوں کو ٹیسٹ سے پہلے اپنے سینے کے بال صاف کرنے ہونگے۔

آپ کی ٹیسٹ کی ہدایت کے مطابق، آپ کو ٹریڈمل ورزش یا فارماکولوجیکل اسٹریس کے دوران ایک ریڈیوٹریسر انجیکشن دیا جائے گا۔ اسٹریس فیز کے بعد، آپ سے کہا جائے گا کہ آپ ہلکا ناشتہ کریں۔ گاما کیمرے کے تحت امیجنگ کی جائے گی۔ پہلے امیجنگ کے نتائج کی بنیاد پر، آپ کو ایک اور انجیکشن کی ضرورت پڑ سکتی ہے جس کے بعد ۲-۳ گھنٹوں بعد مزید امیجنگ کی جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اگلے دن

دوبارہ دوسری امیجنگ کے لیے بلا یا جائے۔
مکمل پروسیجر میں تقریباً ۳-۵ گھنٹے لگیں گے۔

اپنے سابقہ میڈیکل ریکارڈز اور مشورے کی پرچی لے کر آئیں۔

چھوٹے بچوں یا حاملہ خواتین کو ساتھ لانے سے گریز کریں۔

اگر آپ حاملہ ہیں، شبہ ہے کہ حاملہ ہو سکتی ہیں، یا دودھ پلا رہی ہیں تو عملے کو اطلاع دیں۔

آپ کی ٹیسٹ رپورٹ ٹیسٹ مکمل ہونے کے ۲۴ گھنٹوں کے اندر ای-پورٹل پر دستیاب ہوگی۔
(اتوار اور اعلانیہ تعطیلات کے علاوہ)

ایم پی آئی جي اسکین لاء ہدایتون

ٹیسٹ کان ۲-۴ کلاک اڳ خالی پیٹ رهڻ ضروري آهي۔ ٽيسٽ جي ڏينهن هڪ ماني سان ڪير يا پاڻي جو هلڪو ناشتو ڪريو، پر چاهه يا ڪافي کان پرهيز ڪريو۔ هلڪو ناشتو پنهنجي گڏ آڻيو (ترجیحاً هڪ انڊو سينڊوچ ۽ ڪين)۔

ٽيسٽ کان ۲۴ کلاڪ اڳ بيٽا بلاڪر ۽ ڪيلشيم بلاڪر بند ڪري ڇڏيون (پنهنجي بنيادي معالج سان صلاح ڪريو)۔ ٽيسٽ کان ۱۲ کلاڪ اڳ نائيترس جو استعمال بند ڪري ڇڏيون۔ جيڪڏهن توهان دوائون يا انسولين جو انجڪشن وٺي رهيا آهيو ته ٽيسٽ جي ڏينهن انهن کي نه وٺو (پنهنجي شوگر جون دوائون گڏ آڻيو)۔ ٽيسٽ کان ۱۲ کلاڪ اڳ چاهه، ڪافي، چاکليٽ، ۽ ٻين ڪيفين وارن شيون جو استعمال بند ڪري ڇڏيون۔

مرد مريضن کي ٽيسٽ کان اڳ پنهنجا سيني جا وار صاف ڪرڻا پوندا۔

توهان جي ٽيسٽ جي هدايت مطابق، توهان کي ٽريڊمل ورزش يا فارماڪولوجيڪل اسٽريس دوران هڪ ريڊيو ٽريسر انجڪشن ڏنو ويندو۔ اسٽريس فيز کان پوءِ، توهان کي چيو ويندو ته هلڪو ناشتو ڪريو۔ گاما ڪيمرا هيٺ اميڊنگ ڪئي ويندي۔ پهرين اميڊنگ جا نتيجا ٻڌڻ کان پوءِ، توهان کي هڪ ٻي انجڪشن جي ضرورت پئجي سگهي ٿي جنهن کان پوءِ ۲-۳ کلاڪن بعد وڌيڪ اميڊنگ ڪئي ويندي۔ ممڪن آهي ته توهان کي ايندڙ ڏينهن ٻيهر ٻي تصويري جاچ لاءِ سڏيو وڃي۔

مڪمل پروسيجر ۾ تقريباً ۳-۵ کلاڪ لڳندا۔

پنهنجا اڳوڻا ميڊيڪل ريكارڊز ۽ مشوري جي پرچي گڏ آڻيو۔

ندين ٻارن يا حمل واري عورتن کي گڏ آڻڻ کان بچو۔

جيڪڏهن توهان حمل سان آهيو، شڪ آهي ته حمل ٿي سگهي ٿو، يا ڪير پياريندڙ آهيو ته اسٽاف کي اطلاع ڏيو۔

توهان جي ٽيسٽ رپورٽ ٽيسٽ مڪمل ٿيڻ کان ۲۴ کلاڪن اندر اي-پورٽل تي دستياب هوندي۔
(آچر ۽ اعلان ٿيل موڪلن کان سواءِ)