



## FACILITIES EQUIPPED WITH

Dual Head SPECT Gamma Camera

64 Slices PET/CT

ABT Cyclotron (TRAVIS Module)

Nuclear Cardiology Lab

Theranostics' Room

## NUCLEAR MEDICINE & THERANOSTICS

Comprehensive Cancer Centre  
Dow University of Health & Sciences

Ojha Campus; KDA Scheme 33,  
Suparco Road  
Gulzar-e-Hijri, Karachi



SCAN TO VISIT

## CONTACT US



03422019262



021-111-113-847  
(Ext. 3953/3957)



021-111-362-273



nmt@duhs.edu.pk



www.duhs.edu.pk



COMPREHENSIVE CANCER CENTRE  
کمپریہینسو کینسر سینٹر

## CAPTOPRIL RENAL SCAN

Name: \_\_\_\_\_

MR: \_\_\_\_\_

Age: \_\_\_\_\_

Gender: \_\_\_\_\_

Contact No. \_\_\_\_\_

Referred by: \_\_\_\_\_

Appointment D/T \_\_\_\_\_

## Instructions

No need to fast before the test.

Drink 1-2 glasses of water on the day of the procedure.

Stop taking Capoten, Angiotensin II receptor blockers, and calcium blockers 5 days prior to the test. Use alternative antihypertensive medications as advised by your primary physician.

You will receive an injection. You will be imaged under a gamma camera, for twice (may be on next day).

The entire procedure will take about 4-5 hours.

Follow the child sedation policy if applicable.

Bring previous medical records and the advice slip.

Avoid bringing small children or pregnant women.

Inform the staff if you are pregnant, suspect you might be, or are nursing.

Your test report will be available on the e-portal within 24 hours of completion of test. (Except Sunday and Public Holiday)

## ہدایات

ٹیسٹ سے قبل بھوکا رہنے کی ضرورت نہیں۔

ٹیسٹ سے پہلے ۱-۲ گلاس پانی لازمی پئیں۔

ٹیسٹ سے پانچ دن پہلے کیپوٹن، اینجیوٹینسن II ریسیپٹر بلاکرز، اور کیلشیم بلاکرز کو لینا بند کر دیں۔ اپنے پرائمری فزیشن کے مشورے سے متبادل ایٹنی ہائپرٹینسیو ادویات استعمال کریں۔

آپ کو ایک انجیکشن دیا جائے گا۔ آپ کی گاما کیمرے کے نیچے، دو مرتبہ امیجنگ کی جائے گی (ممكن ہے دوسری امیجنگ اگلے دن ہو)۔

مکمل پروسیجر میں تقریباً ۴-۵ گھنٹے لگیں گے۔

چون کو نیم بیہوشی کی پالیسی اگر لاگو ہو تو اس پر عمل کریں۔

سابقہ میڈیکل ریکارڈز اور مشورے کی پرچی لے کر آئیں۔

چھوٹے بچوں یا حاملہ خواتین کو لانے سے گریز کریں۔

اگر آپ حاملہ ہیں، شبہ ہے کہ حاملہ ہو سکتی ہیں، یا دودھ پلا رہی ہیں تو عملے کو اطلاع دیں۔

آپ کی ٹیسٹ رپورٹ ٹیسٹ مکمل ہونے کے ۲۴ گھنٹوں کے اندر ای-پورٹل پر دستیاب ہوگی (اتوار اور اعلانیہ تعطیلات کے علاوہ)

## ہدایتون

ٹیسٹ کان اڳ خالي پيٽ رهڻ جي ضرورت ناهي.

ٹیسٹ کان اڳ ۱-۲ گلاس پاڻي لازمي پيئو.

ٹیسٹ کان پنج ڏينهن اڳ ڪيپوٽن، اينجيوٽينسن II ريسپٽر بلاڪر ۽ ڪيلشيم بلاڪر رڪڻ بند ڪريو. پنهنجي پرائمري فزيسين جي مشوري سان متبادل اينٽي هاءِ پريٽنسيو دوائون استعمال ڪريو.

توهان کي هڪ انجڪشن ڏنو ويندو. توهان جي گاما ڪيمرا جي هيٺ، ٻه ڀيرا اميڊنگ لاءِ رکيو ويندو (ممڪن آهي ته ٻي اميڊنگ ٻئي ڏينهن ڪئي وڃي).

مڪمل پروسيجر ۾ تقريباً ۴-۵ ڪلاڪ لڳندا.

ٻارن کي نیم بیہوشی جي پالیسی جيڪڏهن لاڳو هجي ته ان تي عمل ڪريو.

اڳوڻا ميڊيڪل ريكارڊ ۽ مشوري جي پرچي سان گڏ آڻيو.

نئين ٻارن يا حمل واري عورتن کي گڏ آڻڻ کان پاسو ڪريو.

جيڪڏهن توهان حمل سان آهيو، شڪ آهي ته حمل ٿي سگهي ٿو، يا ڪير پياريندڙ آهيو ته اسٽاف کي اطلاع ڏيو.

توهان جي ٽيسٽ رپورٽ ٽيسٽ مڪمل ٿيڻ کان ۲۴ ڪلاڪن اندر اي-پورٽل تي دستياب هوندي. (آچر ۽ اعلان ڪيل موڪلن کان علاوه)