



FACILITIES EQUIPPED WITH

Dual Head SPECT Gamma Camera

64 Slices PET/CT

ABT Cyclotron (TRAVIS Module)

Nuclear Cardiology Lab

Theranostics' Room

NUCLEAR MEDICINE & THERANOSTICS

Comprehensive Cancer Centre
Dow University of Health & Sciences

Ojha Campus; KDA Scheme 33,
Suparco Road
Gulzar-e-Hijri, Karachi



SCAN TO VISIT

CONTACT US



03422019262



021-111-113-847
(Ext. 3953/3957)



021-111-362-273



nmt@duhs.edu.pk



www.duhs.edu.pk



COMPREHENSIVE CANCER CENTRE
کمپریہینسو کینسر سینٹر

Cardiac PET Sarcoidosis

Name: _____

MR: _____

Age: _____

Gender: _____

Contact No. _____

Referred by: _____

Appointment D/T

Instructions

Follow a high protein, avoid carbohydrate diet (rice, bread, sweet food & drinks, grains, pasta, bread, and starchy vegetables) one day before the test.

If the diet instructions are not followed, the scan may need to be re-booked.

12 hours fasting required before the test. During fasting, only plain water is allowed.

Stop oral medication, insulin injection & steroid medications on the day of the test (bring your diabetic medicines with you).

After history and consent, a radioactive tracer injection will be given.

You will rest for approximately 45-60 minutes after the injection before imaging. You will then undergo PET/CT imaging under the scanner. The scan will take approximately 10-15 minutes.

The entire procedure will take about 4-6 hours

Bring previous medical records and the advice slip.

Avoid bringing small children or pregnant women.

Inform the staff if you are pregnant, suspect you might be, or are nursing.

Your test report will be available on the e-portal within 24-48 hours of completion of test. (Except Sunday and Public Holiday)

*** NOTE: You may be asked for resting MPS a day before FDG PET/CT: A single tracer injection will be administered, followed by heart imaging under a scanning camera. The procedure takes approximately 1-2 hours.**

ہدایات

ٹیسٹ سے ایک دن قبل زیادہ پروٹین والی غذا کھائیں اور چاول، روٹی، میٹھی اشیاء و مشروبات، اناج، پاستا اور نشاستہ دار سبزیوں سے پرہیز کریں۔

اگر غذا سے متعلق ہدایات پر عمل نہ کیا گیا تو اسکین دوبارہ بک کرنا پڑ سکتا ہے۔

آپ کو ٹیسٹ سے پہلے ۱۲ گھنٹے قبل بھوکا رہنا ہوگا۔ بھوکا رہنے کے دوران صرف سادہ پانی پینے کی اجازت ہے۔

ٹیسٹ کے دن تمام ادویات، انسولین کے انجیکشن اور سٹیروئڈ ادویات استعمال نہ کریں۔ (اپنی ذیابیطس کی ادویات اپنے ساتھ ضرور لائیں۔)

ہسٹری اور رضامندی کے بعد ریڈیو ایکٹو ٹریسر کا انجیکشن دیا جائے گا۔

انجیکشن کے بعد تقریباً ۴۵ سے ۶۰ منٹ آرام کرنا ہوگا تاکہ ٹریسر جسم میں مناسب طور پر پھیل سکے۔ اس کے بعد آپ کا اسکین کیا جائے گا۔ اسکین میں تقریباً ۱۰ سے ۱۵ منٹ لگیں گے۔

مکمل پروسیجر میں تقریباً ۴-۶ گھنٹے لگیں گے۔

اپنے پچھلے میڈیکل ریکارڈز اور مشورے کی پرچی ساتھ لائیں۔

چھوٹے بچوں یا حاملہ خواتین کو ساتھ لانے سے گریز کریں۔

اگر آپ حاملہ ہیں، شبہ ہو کہ حاملہ ہو سکتی ہیں، یا دودھ پلا رہی ہیں تو عملے کو اطلاع دیں۔

آپ کی ٹیسٹ رپورٹ ٹیسٹ مکمل ہونے کے ۲۴-۴۸ گھنٹوں کے اندر امی-پورٹل پر دستیاب ہوگی۔ (اتوار اور اعلانیہ تعطیلات کے علاوہ)

اسکین سے ایک دن پہلے آپ سے آرام کی حالت میں مایوکارڈیل پرفیوژن اسکین کروانے کے لیے کہا جا سکتا ہے۔ اس طریقہ کار کے دوران ایک مرتبہ ریڈیو ٹریسر کا انجیکشن دیا جائے گا، جس کے بعد اسکیننگ کیمرس کے ذریعے دل کی تصاویر حاصل کی جائیں گی۔ یہ عمل تقریباً ۱ سے ۲ گھنٹے میں مکمل ہو جاتا ہے۔

ہدایتون

ٹیسٹ کان ھک ڈینھن اڳ وڌیک پروٽین واری خوراک کائو ۽ چانور، مانی، منیون شیون ۽ مشروبات، اناج، پاستا ۽ نشاستی واریون پاچیون کائون پاسو کریو۔

جیکڏھن غذا بابت هدايتن تي عمل نه کيو ويو ته اسکين بيهر ٻڪ ڪرڻو پئجي سگهي ٿو۔

توهان کي ٽيسٽ کان اڳ ۱۲ ڪلاڪ پوکو رهڻو پوندو۔ پوکو رهڻ دوران صرف سادو پاڻي پيئڻ جي اجازت هوندي۔

ٽيسٽ واري ڏينهن سڀني دوائون، انسولين جا انجڪشن ۽ اسٽيرائڊ دوائون استعمال نه ڪريو۔ (پنهنجون ذیابیطس جون دوائون پاڻ سان ضرور کڻي اچو۔)

هسٽري ۽ رضامندي کان پوءِ ريڊيو ايڪٽو ٽريسر جو انجڪشن ڏنو ويندو۔

انجڪشن کان پوءِ تقريباً ۴۵ سے ۶۰ منٽن تائين آرام ڪرڻو پوندو ته جيئن ٽريسر جسم ۾ صحيح نموني ڦهلي سگهي۔ ان کان پوءِ توهان جو اسکين ڪيو ويندو۔ اسکين ۾ تقريباً ۲۰ کان ۴۰ منٽ لڳندا۔

مکمل پروسیجر ۾ تقريباً ۴-۶ ڪلاڪ لڳندا۔

پنهجا اڳوڻا ميڊيڪل ريكارڊز ۽ مشوري جي پرچي گڏ آڻيو۔

نين ٻارن يا حمل واري عورتن کي گڏ آڻڻ کان بچو۔

جیکڏھن توهان حمل سان آهيو، شڪ آهي ته حمل ٿي سگهي ٿو، يا کير پياريندڙ آهيو ته اسٽاف کي اطلاع ڏيو۔

توهان جي ٽيسٽ رپورٽ ٽيسٽ مکمل ٿيڻ کان پوءِ ۲۴-۴۸ ڪلاڪن اندر اي-پورٽل تي دستياب هوندي۔ (اچر ۽ اعلان ٿيل موڪلن کان سواءِ)

اسکين کان ھڪ ڏينھن اڳ توهان کي آرام واري حالت ۾ مائيوڪارڊيل پرفيوزن اسکين (Resting MPS) ڪرائڻ لاءِ چيو وڃي سگهي ٿو۔ هن طريقيڪار دوران هڪ ڀيرو ريڊيو ٽريسر جو انجڪشن ڏنو ويندو، جنهن کان پوءِ اسڪيننگ ڪئميرا ذريعي دل جون تصويرون ورتيون وينديون۔ هي عمل لڳ ڀڳ ۱ کان ۲ ڪلاڪن ۾ مڪمل ٿي ويندو۔